

## **La VERDAD acerca de la vacuna contra el VPH**

### **¿Porque es importante proteger a su hijo con la vacuna contra el VPH?**

VPH (virus del papiloma humano) puede causar cáncer de cuello del útero, vagina y la vulva en mujeres, para hombres puede causar cáncer de pene, para hombres y mujeres canceres de ano y garganta y también verrugas.

Actualmente alrededor de **4 de cada 5 personas** tendrán el VPH en algún momento de sus vidas.

### **¿Si funciona la vacuna contra el VPH?**

¡Sí! La vacuna, cuando se administra a la edad recomendada, es casi 100% eficaz en la prevención precancerosas y las verrugas genitales.

### **¿Cuándo debe de recibir la vacuna de VPH mi hijo?**

Recomendamos que su hijo reciba la vacuna contra el VPH a los 11 años o 12 años de edad. Lo más temprano que se puede administrar es a la edad de 9 años, y las personas pueden recibir vacunas para ponerse al día hasta los 26 años de edad.

A pesar de que su hijo no es expuesto al VPH hasta que esté sexualmente activa, se ha encontrado que la vacuna funciona mejor cuando se le da a una edad temprana.

### **¿Es segura la vacuna contra el VPH?**

Sí. La vacuna fue estudiada durante años y probada en 29,000 voluntarios para seguridad antes de ser aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Desde el año 2006 más de 86 millones de dosis se han dado sin efectos secundarios más graves de cualquier otra vacuna que su hijo ha recibido.

Quizás usted ha oído que el VPH ha causado la muerte o la infertilidad- esto no es correcto. Este mito se basa en una interpretación equivocada de la ciencia en como estudiamos las vacunas. Cuando se estudian las vacunas, todos los eventos que toman lugar después de que las personas reciben la vacuna son reportadas al CDC. Ninguna de las 14 muertes registradas (de los 29,000 voluntarios iniciales) fue causada por la vacuna. La vacuna tampoco ha causado problemas de fertilidad.

### **¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna contra el VPH?**

Los efectos secundarios más comunes de la vacuna contra el VPH, al igual que todas las otras vacunas son, dolor, hinchazón o enrojecimiento en el brazo donde se aplicó la inyección, desmayos, fiebre, dolor de cabeza o fatiga, y el dolor muscular.

Reacciones alérgicas graves a la vacuna son raras. Todos los niños que reciben la vacuna del VPH son supervisados por 15 minutos después de su primera vacuna para asegurarse de que no tengan síntomas de una reacción grave. Asegúrese de hacernos saber si el niño es alérgico a la levadura o látex.



## **¿La vacuna animara la actividad sexual?**

No. Esto ha sido estudiado, y no hay deferencia en la edad de la actividad sexual inicial en las personas que recibieron o no recibieron la vacuna. Además tener conversaciones al principió sobre los riesgos del sexo, así como la importancia de la abstinencia o el sexo seguro para proteger a su hijo/a se ha demostrado retrasar la edad en la cual los niños empiezan a tener experiencias sexuales.