



Posible Reacciones a las Vacunas

La mayoría de los niños no tiene reacción a sus vacunas, de cualquier manera, es común que algunos niños tengan reacciones leves a las vacunas, usualmente por 2-3 días.

- Tdap, DTaP, IPV, HIB, HEPATITIS B, PCV 13; puede tener, fiebre, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección.
- MMR; la reacción se puede retrasar de 7-10 días, y puede ser síntomas en el sistema respiratorio, fiebre, un sarpullido leve que dure 2-3 días y ardor cuando se pone.
- HEPATITIS A; puede estar adolorido en el lugar de la inyección, dolor de cabeza.
- VARICELA; enrojecimiento o adolorido en el lugar de la inyección, fiebre y puede desarrollar un sarpullido hasta un mes después de la vacuna.
- ROTAVIRUS; temporalmente vómito y diarrea leves
- MENINGOCOCICA, INFLUENZA; hinchazón en el lugar de la inyección, enrojecimiento, dolor de cabeza.

QUE PUEDE HACER

Planee estar más tiempo con su niño/a mímelo, abrázelo o arrúllelo.

Para la fiebre le puede dar Acetaminophen (Tylenol o las otras marcas están bien) cada cuatro horas o un baño de agua tibia. Vístalo con ropa ligera y de le suficientes líquidos.

Para la hinchazón, póngale compresas de agua tibia en el lugar de la inyección de 10 a 15 minutos 2-3 veces por día.

CUANDO LLAMARNOS

- ✓ Si el enrojecimiento, hinchazón o fiebre duran más de 72 horas.
- ✓ Si el enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección se empeora después de 3 días.
- ✓ Si su niño/a tiene dificultad para despertarse cuando usted supone que debería estar despierto/a.
- ✓ Si su niño/a llora y no lo puede consolar.
- ✓ Si su niño/a tiene fiebre de 105 grados.
- ✓ Si a su niño/a le da vomito o diarrea u otros síntomas que usted no espera.

NOSOTROS SIEMPRE ESTAMOS DISPONIBLES PARA SUS PREGUNTAS, Y UN DOCTOR ESTA SIEMPRE DISPONIBLE POR TELEFONO AUNQUE ESTEMOS CERRADOS. SOLAMENTE TIENE QUE LLAMAR AL NUMERO DE TELEFONO DE LA CLINICA. (503)640-2757